



Ontslagmedicatie ('gouden vijf')

Publicatienummer: 2010.9500

Middel	STEMI	IAP / Non-STEMI
Acetylsalicylzuur	Oplaaddosis 125-325mg in een kauwbare vorm of 250-500mg Aspegic iv Onderhoudsdosis 75- 100 mg levenslang (level of evidence I-A)	Oplaaddosis 125-325mg in een kauwbare vorm Onderhoudsdosis 75-160mg levenslang (level of evidence I-A)
Clopidogrel/ Thienopyridines	Oplaaddosis 300-600mg Oraal aanbevolen 600mg Onderhoudsdosis 75mg gedurende 1 jaar (level of evidence IIaC)	Oplaaddosis 300-600mg Oraal aanbevolen 600mg. Onderhoudsdosis 75mg gedurende 1 jaar (level of evidence I-A)
Statine	Start zo spoedig mogelijk; binnen 1-4 dagen na opname. Startdosis onduidelijk. Doel: LDL <2.5mmol/L (level of evidence I-A)	Start zo spoedig mogelijk; binnen 1-4 dagen na opname. Doel: LDL < 2.5mmol/L (level of evidence I-B)
Bètablokker	Bij opname aanbevolen iv bij alle laag risico, hemodynamisch stabiele patiënten (level of evidence IIa-B) Bij ontslag aanbevolen bij alle patiënten (level of evidence I-A).	Bij alle patiënten zonder contraïndicaties (level of evidence Ia)
ACE-remmer	Binnen 24uur na aankomst bij patiënten zonder contraïndicatie (level of evidence IIa-A) Voor hoog risico patiënten en patiënten met verminderde LVF (level of evidence I-A) Starten met laagste dosis	Binnen 24uur na aankomst bij patiënten met EF<40%, met DMII, HT of nierarteriesclerose (level of evidence I-A). Alle patiënten zonder contraïndicatie (level of evidence IIa-B)